

Caractéristiques

Murin forte block est un bloc paraffiné pour rongeurs prêt à l'emploi à base d'une substance active anticoagulante, connue comme Bromadiolone, efficace contre la souris domestique (*Mus musculus*), rat brun (*Rattus norvegicus*) et rat noir (*Rattus rattus*) également après une seule ingestion.

Murin forte block contient une substance amère vouée à prévenir l'ingestion accidentelle de la part des enfants. **Murin forte block** peut être utilisé à l'intérieur et autour d'édifices industriels (également dépôts de marchandises et soutes de navires) dans des zones rurales, civiles, logements, caves, garages, débarras et jardins ou zones externes, décharges et égouts.

Usage et doses

Le produit est prêt à l'emploi conformément aux dosages reportés ci-dessous. Eviter de toucher le produit à mains nues et utiliser des gants adéquats. L'appât doit être utilisé exclusivement dans un récipient approprié, protégé contre les agents atmosphériques, contre l'ingestion accidentelle de la part des enfants et des espèces non ciblées et contre la dispersion dans l'environnement. Observer la zone d'infestation et mettre les récipients qui contiennent l'appât près des nids, le long des parcours des rongeurs et dans les endroits avec une forte présence.

Pour les rats, utiliser jusqu'à 250 g par appât. Placer des appâts à une distance de 10 m et les réduire à 5 mt pour des infestations majeures.

Pour les souris utiliser 20-40 g appât. Placer des appâts tous les 5 mètres en les réduisant à 2 m en cas d'infestations majeures. Les souris sont très curieuses et il peut être utile, pour l'efficacité du traitement, de déplacer les appâts tous les 2-3 jours quand les appâts sont inspectés et/ou rechargés. La mort se produit quelques jours à compter de l'ingestion, typiquement 4-10 jours.

Signaler de façon adéquate la zone intéressée par le traitement en indiquant le risque d'empoisonnement et les premières mesures de secours.



Murin Forte Block

Appât pour rongeurs prêt à l'emploi.

Usine

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Apparence, couleur et odeur

Couleur rouge, solide avec odeur de beurre.

Composition

Bromadiolone	0,005 g
Benzoate de dénatonium	0,001 g
Substances agréables au goût et co-formulants q.s. à	100 g

Avertissements

Les récipients doivent être placés de façon sûre, afin de minimiser le risque d'effraction et d'ingestion accidentelle de la part des enfants ou des animaux non ciblés. Toujours vérifier que les récipients sont fixés de façon adéquate et que les appâts ne peuvent être déplacés par les rongeurs. Eviter les traitements en présence d'aliments ou de nourriture pour animaux non protégés. Ne pas utiliser dans l'agriculture. En cas de contamination se laver soigneusement et abondamment les mains à l'eau et au savon. Ne pas réutiliser l'emballage vide et ne pas l'éliminer dans l'environnement mais conformément aux normes en vigueur. En cas d'ingestion suspecte, consulter un centre antipoison. Le produit peut être dangereux si avalé par des animaux domestiques ou autres animaux non ciblés. En cas d'ingestion constatée, provoquer le vomissement. Contacter immédiatement un vétérinaire en lui montrant le récipient ou l'étiquette.

